



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

Fiche d'information sur l'ABCES DE LA MARGE ANALE

1°) Définition :

Un abcès anal est une cavité remplie de pus située à proximité de l'anus entraînant de vives douleurs. La cause la plus fréquente des abcès de l'anus est la fistule anale qui est une infection d'une glande du canal anal progressant dans le sphincter anal pour aboutir à la peau située autour de l'anus ou à la fesse. Ces glandes peuvent s'infecter chez n'importe qui, sans raison particulière.

2°) Intervention de l'abcès de la marge anale :

Cette intervention a pour but d'évacuer le pus sous tension pour soulager la douleur et éviter la diffusion de l'infection. Elle doit être réalisée rapidement pour éviter cette complication. Les antibiotiques ont en effet une efficacité insuffisante pour traiter à eux seuls un abcès anal.

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale ou locorégionale. Elle consiste à réséquer une collerette de peau, ce qui permet d'ouvrir largement la poche de l'abcès sans risque d'accolement précoce des berges source de récurrence. La plaie opératoire est donc laissée ouverte. Dans le même temps opératoire, si la cause de l'abcès est retrouvée (par exemple une fistule anale), un traitement spécifique de cette cause peut être réalisé.

Après l'opération des soins locaux sont nécessaires. Selon l'importance de l'abcès et de la plaie, ils peuvent ou non nécessiter la prescription de soins infirmiers. Selon les cas, des lavages, nettoyages aux antiseptiques, méchages (introduction d'une gaze ou d'un pansement dans la cavité de l'abcès) ou application simple de crème ou de pommade sont nécessaires. La cicatrisation de la plaie opératoire demande quatre à six semaines. La gêne, parfois la douleur imposent un arrêt de travail qui varie selon la taille de la plaie de quelques jours à quelques semaines.

.../...

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX

Secrétariat chirurgie: 04.71.09.88.22 Standard: 04.71.09.88.00



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

.../...

3°) En préopératoire :

- Vous avez donc bénéficié d'une consultation, auprès du chirurgien :
- Le chirurgien vous a expliqué la nécessité, le but, les tenants et aboutissants de la mise à plat d'un abcès de la marge anale.
- La date opératoire a été convenue, ainsi qu'un rendez-vous auprès de nos confrères anesthésistes.
- Au cas par cas, un rendez-vous auprès d'un pneumologue, ou d'un cardiologue sera demandé.

- D'autre part, différents documents vous seront remis dont :
- Une fiche de préadmission : à présenter complétée le jour de votre rendez-vous avec l'anesthésiste à l'accueil principal de la clinique.
- Un questionnaire médical pour les anesthésistes : nécessité de le remplir avant le rendez-vous et à compléter lors de l'entretien.
- Cette fiche d'information: à signer et à remettre à la secrétaire d'anesthésie lors de la consultation.
- Une ordonnance de Bétadine scrub et un document explicatif.

4°) L'hospitalisation en chirurgie ambulatoire :

- *Avant l'intervention :*
- La veille de l'intervention, vous devez :
 - Prendre une douche antiseptique **à votre domicile**, en vous savonnant entièrement (de la tête aux pieds) avec de la Bétadine scrub ou un générique. En cas d'allergie à l'iode, l'Hibiscrub vous sera conseillé(e).
 - Après rinçage avec l'anti septique, lavez-vous une seconde fois au niveau de la zone opérée, toujours à la Bétadine scrub ou avec l'Hibiscrub et rincez de nouveau. Ces précautions sont essentielles pour obtenir une bonne asepsie cutanée et réduire le risque d'infection post opératoire.
- Le matin de l'intervention, avant de vous rendre à l'unité de chirurgie ambulatoire, vous devez :
 - A nouveau prendre une douche antiseptique **à votre domicile**, en vous savonnant, cette fois encore, complètement, avec de la Bétadine Scrub ou de l'Hibi scrub.
 - Séchez-vous avec une serviette propre et mettez des sous-vêtements propres.
 - Vous ne devez avoir ni bijou, ni maquillage (rouge à lèvres, vernis à ongles) ni lentille de contact. Les appareils dentaires amovibles doivent être enlevés avant l'anesthésie.

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

- . **Etre strictement à jeun** (ni boire, ni manger à partir de minuit). Nécessité d'arrêter de fumer et s'abstenir de prendre de l'alcool.
- . Si vous prenez habituellement des médicaments le matin, le médecin anesthésiste vous précisera si vous devez ou non les prendre le matin de l'intervention.
- . Vous devez obligatoirement prévoir un accompagnant pour votre retour à domicile. Il faudra pour cela le contacter.

- *Arrivée à la clinique :*

- . RESPECTER IMPERATIVEMENT L'HEURE DE VOTRE CONVOCATION
- . Faire votre entrée administrative à l'accueil principal de la clinique.
- . Monter dans le service AMBULATOIRE au 2^{ème} étage, où vous serez accueilli(e) par l'infirmière.
- . Remettre à l'infirmière votre dossier d'entrée, et les résultats d'examens sanguins et morphologiques si nécessaire.

- *Bloc opératoire dans la journée :*

Au cours de la journée, vous serez descendu(e) au Bloc opératoire où vous bénéficierez à nouveau d'une préparation cutanée.

L'intervention de la mise à plat d'un abcès de la marge anale dure en moyenne 30 minutes.

- *Sortie de la Clinique :*

Elle s'effectuera en fin de journée après avoir revu le chirurgien. En cas d'état clinique ne permettant pas un retour à domicile, vous serez bien sûr transféré(e) dans un lit d'hospitalisation classique pour être surveillé(e) le temps nécessaire.

Lorsque vous quitterez la clinique, les papiers suivants vous seront donnés :

- . Des ordonnances d'antalgiques et d'anti-inflammatoire.
- . 2 rendez-vous de consultation postopératoire avec le chirurgien vous seront notifiés.
- . Un arrêt de travail si besoin.

Un exemplaire de votre courrier sera envoyé aux différents médecins correspondants.

5°) Les complications possibles :

Le risque de complication immédiate est minime :

- . Une hémorragie immédiate ou retardée est peu fréquente.

.../...

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

.../...

. Une rétention urinaire (impossibilité de vider sa vessie) peut s'observer avant le drainage par un phénomène réflexe et également après, comme après toute chirurgie proctologique. Elle peut nécessiter la mise en place temporaire d'une sonde dans l'urètre (le canal servant à uriner).

. Récidive si la cause de celui-ci n'a pas été traitée. Cette cause peut être difficile à mettre en évidence en phase d'abcès. Le drainage simple n'expose pas à un risque d'incontinence anale mais si la nécrose (destruction des tissus) concerne le sphincter anal, cela signifie que le muscle qui participe à la continence anal peut être endommagé par l'abcès source d'incontinence secondaire. Il est donc important d'intervenir suffisamment tôt pour éviter cette situation.

\

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX

Secrétariat chirurgie: **04.71.09.88.22** Standard: **04.71.09.88.00**